

Tájékoztató Hepatitis B védőoltás esedékességéről

(A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésről szóló többszörösen módosított 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 5. és 15. § alapján)

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Értesítem, hogy gyermeke, **Hepatitis B védőoltásra kötelezett.**

Az oltás helye:

Az oltás várható időpontja:

Kérem, szíveskedjék gyermeke **Oltási könyvét és a tájékoztatásról szóló igazoló szelvényt** az iskola-védőnőhöz eljuttatni!

Tájékoztatom, hogy amennyiben gyermeke kötelező védőoltása, megalapozott orvosi indok nélkül, többszöri értesítés ellenére elmarad, akkor az ÁNTSZ illetékes kistérségi intézete a védőoltás beadását határozattal rendeli el.

Amennyiben védőoltását már megkapta, oltási könyvét mutassa be. Betegség, vagy várható műtét miatt, ha a gyermek nem oltható kérjük írásba jelezze.

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Hepatitis B (fertőző májgyulladás) – megelőzése céljából Magyarországon, az általános iskolák 7. osztályát végző gyermek, illetve az adott évi Védőoltási Módszertani Levélben meghatározott korcsoportú gyermek Hepatitis B elleni védőoltásra kötelezett. A védettség kialakulásához 2 oltásra van szükség. A második oltás az első oltást követően 6 hónap múlva esedékes.

Hepatitis B vírus (HBV) vérrel, szövetnedvekkel, váladékokkal terjed.

Lappangási idő: 45–180 nap, leggyakrabban 60–90 nap.

Fontosabb tünetek: Lassan kezdődik, rendszerint láz nélkül. A betegnél fáradtság, ízületi fájdalmak, étvágytalanság jelentkezik, majd ezt követően a sárgaság. A fertőzés krónikussá válhat. A krónikus fertőzés kialakulásának kockázata annál nagyobb, minél korábbi életkorban következik be a fertőződés. Késői következménye a májcirrhosis és a májrák.

Az oltás helyén fellépő bőrpír duzzanat beavatkozás nélkül megszűnik. Jelentkezhet láz, hányás, hasmenés, nyugtalanság. A tünetek tartós fennállása esetén haladéktalanul jelentkezni kell az oltóorvosnál, háziorvosnál!

Hepatitis B (fertőző májgyulladás) tájékoztató

✂ ... ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂

Aláírással igazolom, hogy a Hepatitis B védőoltásról szóló tájékoztatást megkaptam:

Gyermek neve:

osztály:

Hepatitis B vírus (HBV) terjedése Magyarországon
Lappangási idő: 45–180 nap, leggyakrabban 60–90 nap.
Fontosabb tünetek: Lassan kezdődik, rendszerint láz nélkül. A betegnél fáradtság, ízületi
fájdalmak, étvágytalanság jelentkezik, majd ezt követően a sárgaság. A fertőzés krónikussá
válhat. A krónikus fertőzés kialakulásának kockázata annál nagyobb, minél korábbi életkorban
következik be a fertőződés. Késői következménye a májcirrhosis és a májrák.

Szülő aláírása

Az oltás helyén fellépő bőrpír duzzanat beavatkozás nélkül megszűnik. Jelentkezhet láz, hányás, hasmenés, nyugtalanság. A tünetek tartós fennállása esetén haladéktalanul jelentkezni kell az oltóorvosnál, háziorvosnál!